

SLP Schwäbische Landprodukte GmbH

Johanna Zorn-Sailer
Telefon +49 (09070) 91003/Telefax +49 (09070) 91001
86660 Tapfheim-Erlingshofen

KW 20 (12.5.2015) / Dinkel Stadium 37

Die meisten Dinkelbestände erreichen diese Woche das Stadium 37 (Erscheinen des Fahnenblatts).

Ab diesem Zeitpunkt sollte die ertragsbetonte N-Spätdüngung erfolgen.

Wir empfehlen N-Gaben – je nach Ertragsniveau und bisheriger N-Düngung – von 40 -70 kg Rein-N.

Bei sehr mastigen Beständen ist ein Einsatz von Moddus, Medax top oder Cerone 660 empfehlenswert.

Die Fungizid Abschluss-Spritzung sollte je nach Situation noch hinausgeschoben werden. Ein Abstand von ca. 4 Wochen zur ersten bzw. vorhergehenden Fungizidspritzung ist durchaus möglich.

Nur bei hohem Krankheitsdruck sollte die Abschluss-Spritzung unverzüglich erfolgen. Es können alle gängigen Fungizide eingesetzt werden, die kein Tebuconazol enthalten. Es ist empfehlenswert, ein Insektizid gegen Getreidehähnchen einzusetzen.

Michael Sailer